

Cibuľoviny a hľuznaté rastliny

Rastlinné druhy vytvárajúce zásobné orgány vo forme cibúľ, hľúz alebo zhrubnutých podzemkov. Táto skupina zahrnuje veľmi pestrú škálu druhov s rozdielnym uplatnením, nárokmi, ako aj rozdielnou trvanlivosťou. Rôznorodosť sa odzrkadľuje aj v zakladaní výsadiieb v odlišných termínoch. Preto často hovoríme o **cibuľovinách jesenných** (s termínom výsadby v jeseni jedného roka a kvitnutím obyčajne na začiatku budúcej sezóny), **cibuľovinách jarných** (termín výsadby na jar a začatím vegetácie po uplynutí obdobia mrazov), prípadne alternatívne pestovaných z cibúľ posadených na jar, v jeseni alebo v inej dobe. Jesenné cibuľoviny kvitnú v období od februára do júna (napr. snežienky a cesnaky), jarné kvitnú počas leta a jesene a väčšinou sa jedná o chýlostivé druhy, ktoré vonku neprezimujú. Preto sa ich zásobné orgány uskladňujú v bezmrazých, suchých a tmavých priestoroch.

Príklady :

- Jesenné cibuľoviny: tulipán, narcis, hyacint, šafran, snežienka, bleduľa, okrasné cesnaky, kosatce, bledavky, scily, puškínie, korunky a iné
- Jarné cibuľoviny a hľuznaté rastliny : georgína, gladiola, begónia hľuznatá, kana indická a iné
- Alternatívne druhy : orientálne a ázijské hybridy ľalií, iskerník ázijský, frézie, facka, holandské kosatce, nerine, montbrécie a ďalšie.





tulipány



šafraňy





narcisy



modrice





l'alie



kany





georgíny (dália)



fakľa